

اثر سینرژیک لیزوزیم در پوشش کیتوزان حاوی اسانس زیره سبز

مژگان حیدری^۱، پیمان مهستی شتربانی^{۲*}، افشین آخوندزاده بستی^۳

- ۱- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گروه صنایع غذایی
- ۲- گروه کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
- ۳- گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

(تاریخ دریافت: ۹۵/۰۷/۱۳ تاریخ پذیرش: ۹۵/۰۸/۱۵)

چکیده

در این تحقیق پوشش کیتوزان به همراه لیزوزیم و روغن زیره سبز برای افزایش ویژگی انتی باکتریال پوشش کیتوزان به کار برده شد. پس از تهیه پوشش کیتوزان ۲ درصد حاوی غلظت‌های مختلف لیزوزیم و غلظت یک درصد اسانس زیره سبز، ویژگی‌های ضدマイکروبی این پوشش‌ها در فیله مرغ نگهداری شده در دمای یخچالی مدت ۱۲ روز از لحاظ ویژگی‌های میکروبی (شمارش کلی باکتری‌های هوایی، شمارش باکتری‌های سرمادوست، شمارش باکتری سودوموناس و شمارش کلی فرم‌ها) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که روز ۱۲ تعداد باکتری‌های مزووفیل ۳ لگاریتم در هر گرم و تعداد باکتری‌های سرما دوست ۳ و کلی فرم ۱,۱ و سودوموناس ۳ لگاریتم در هر گرم کاهش نشان دادند. نتایج نشان می‌دهند لیزوزیم ۱۰ درصد به کاررفته در پوشش کیتوزان حاوی اسانس زیره سبز اثر هم افزایی داشته و می‌تواند نقش مهمی را در افزایش کیفیت محصولات بسته بندی شده داشته باشد و میزان ماندگاری را در محصولات گوشتی افزایش دهد.

کلید واژگان: پوشش، لیزوزیم، زیره سبز، ضد میکروبی، هم افزایی

*مسئول مکاتبات: pmahasti@yahoo.com

مربوط به کومینول است. در اسانس زیره مواد دیگری نظری سیمن، فلاندرین، کارون و مواد دیگری به نسبت کم گزارش شده است [۳].

امیری و همکاران (۱۳۸۷)، در خصوص بهبود خواص ضدمیکروبی آنژیم لیزوژیم و افزایش طیف عملکرد این آنژیم مطالعه کردند. گلیکوزیله کردن لیزوژیم با دکستران با نسبت وزنی ۱ به ۵ در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد برای مدت زمان یک هفته تحت رطوبت نسبی ۷۹٪ صورت گرفت. نتایج حاصل از اندازه گیری گروههای آمینی آزاد نشان داد که ۳/۷ مول دکستران به یک مول لیزوژیم متصل شده است، در حالی که فعالیت آنژیم کثروگه طی گلیکوزیله شدن به ۶۲٪ کاهش یافت. کثروگه لیزوژیم دکستران برخلاف آنژیم اصلاح نشده کاملاً بر باکتری گرم منفی اشرشیا کلی مؤثر بود. بنا بر نتایج به دست آمده، لیزوژیم اصلاح شده با دکستران می تواند برخلاف لیزوژیم به عنوان یک ترکیب ضدمیکروبی طبیعی باکتریهای گرم منفی در سیستم‌های غذایی استفاده گردد. [۱]

Ojagh و همکاران (۲۰۱۰)، فیلم خوراکی کیتوزان را با اسانس دارچین بررسی کردند. با افزایش غلظت اسانس خاصیت ضدمیکروبی افزایش یافت [۴].

یکی از چالش‌های مهم صنایع بسته‌بندی فراورده‌های پروتئینی به‌ویژه فیله مرغ، افزایش زمان ماندگاری محصول می‌باشد لذا بران شدید که با اثر هم افزایی تاثیر انتی باکتریال آنژیم لیزوژیم بر پوشش‌هایی کیتوزان همراه با اسانس زیره سبز برویزگی‌های میکروبی فیله مرغ و مدت زمان ماندگاری آن را بررسی نماییم.

۲- روش پژوهش

به منظور بررسی اثر پوشش کیتوزان حاوی اسانس زیره سبز و بر روی ویژگی‌های میکروبی فیله مرغ نگهداری شده در دمای یخچالی دانه گیاه زیره سبز *Cuminum cyminum*، خرداد سال ۱۳۹۴ از منطقه سبزوار استان خراسان رضوی تهیه گردید.

۱- مقدمه

آنژیم لیزوژیم از جمله ترکیبات ضدمیکروبی است که به طور فراوان در طبیعت یافت می‌شود [۱] و به وسیله گیاهان، قارچ‌ها، باکتری‌ها، پرندگان و پستانداران تولید می‌گردد. لیزوژیم به فرم مونومر در سفیده تخمر غوغ یافت می‌شود. لیزوژیم سفیده‌ی تخمر غوغ یک منع غنی از پیتیدهای فعال زیستی نظری پیتیدهای ضدمیکروبی، ضد سلطانی، تنظیم‌کننده‌ی سیستم ایمنی است. لیزوژیم سفیده‌ی تخمر غوغ در صنعت به عنوان نگهدارنده‌ی طبیعی برای جلوگیری از رشد باکتری در محصولات گوشتی نظری سوسیس، گوشت گاو و گوشت گوسفند استفاده می‌شود. بعلاوه مشخص شده است که لیزوژیم دناتوره شده به وسیله گرمایی فعالیت ضدمیکروبی خوبی را از خود نشان می‌دهد. تهیه‌ی پیتید از هیدرولیز آنژیمی لیزوژیم با استفاده از آنژیم پیسین در صنعت برای تولید افزودنی‌های طبیعی در فرآوری غذایی استفاده می‌شود. به طور کلی از آنجایی که لیزوژیم سفیده‌ی تخمر غوغ فعالیت‌های زیستی متعدد از خود نشان می‌دهد، می‌تواند به عنوان افزودنی یا نگهدارنده در فرآوری محصولات غذایی و نیز در فرمولاسیون داروهای ضد سلطانی، ضدمیکروبی و نیز داروهای تنظیم‌کننده‌ی سیستم ایمنی مورد استفاده قرار گیرد.

استفاده از عوامل ضدمیکروبی طبیعی همراه با مواد پلیمری جهت گسترش مواد پوشش‌دهنده و بسته‌بندی ضدمیکروبی غذایی، یک موضوع جدیدی است [۲].

کیتوزان پلی ساکاریدی است که به صورت صنعتی از دی استیلاسیون^۱ کیتین سخت پوستان مانند حشرات، خرچنگ‌ها، میگوها، لاپسترها و دیواره سلولی نوع خاصی از جلبک‌ها و قارچ‌ها تهیه می‌شود

اسانس‌ها، روغن‌های معطر مایع هستند که از بخش‌های مختلف گیاهی به دست می‌آید. اسانس زیره سبز *Cuminum cyminum L.* به لحاظ داشتن ساختار فتلی، دارای فعالیت آنتی اکسیدانی می‌باشد. بوی مخصوص اسانس و میوه زیره سبز

1. De-acetylation

۵-۲-شمارش باکتری‌های سرما دوست

شمارش تعداد باکتری‌های سرما دوست به روش کریم ۱۳۸۲ انجام شد [۶].

۶-۲-شمارش سودوموناس

شمارش تعداد باکتری‌های سودوموناس به روش استاندارد ملی شماره ۱۴۷۹۱ انجام شد [۷].

۷-۲-شمارش کلی فرم‌ها

شمارش نعداد کلی فرم‌ها به روش استاندارد ملی شماره ۱۱۱۶۶ انجام شد [۸].

۳-تجزیه تحلیل داده‌ها

تجزیه و تحلیل داده براساس تعیین میانگین و آنالیز واریانس یک طرفه توسط نرم افزار SPSS انجام شد.

۴-نتیجه گیری

در این تحقیق، تلاش شد تأثیر غلاظت‌های مختلف لیزوژیم و اسانس زیره سبز به کاررفته در ساختار پوشی کیتوزان، جهت افزایش ماندگاری میکروبی فیله مرغ، بررسی گردید.

نتایج ارزیابی شمارش تعداد کلی باکتری‌های هوایی در تیمارهای مختلف نشان داد که در نمونه‌های فیله مرغ بسته‌بندی شده با غلاظت‌های لیزوژیم و پوشش کیتوزان حاوی غلاظت اسانس زیره سبز یک درصد و نگهداری شده در دمای یخچالی در طی ۱۲ روز، در تمامی روزهای آزمون، در تمامی تیمارها، شمارش تعداد کلی باکتری‌های هوایی به صورت معنی‌داری ($P < 0.05$) افزایش نشان داده است. نتایج شمارش تعداد باکتری‌های هوایی در جدول ۱ در مدت ۱۲ روز بر حسب میانگین Log cfu/g ذکر شده است.

جهت تهیه اسانس از زیره سبز، مقدار ۱۵۰ گرم از این گیاه به روش تقطیر با بخار داغ (Steam distillation) توسط دستگاه کلونجر استفاده شد.

۱-۲-تهیه پوشش بر پایه کیتوزان

۲ گرم از کیتوزان در ۱۰۰ سی سی محلول اسید استیک ۱ درصد حل شد، برای دستیابی به پخش شدن کیتوزان به صورت مناسب، کیتوزان به مدت ۳ ساعت در دمای اتاق بر روی همزن مغناطیسی به مخلوط شده و سپس گلیسرول به میزان ۷۵/۰ میلی لیتر به ازای هر گرم کیتوزان اضافه کردید و به مدت ۱۰ دقیقه محلول مخلوط شد. محلول کیتوزان با استفاده از کاغذ واتمن شماره ۳ صاف شده تا مواد نامحلول جدا شوند سپس اسانس‌های زیره سبز با غلاظت‌های صفر به عنوان شاهد و غلاظت ۱ درصد و و لیزوژیم با غلاظت‌های ۵، ۱۰ و ۲۵ درصد (مرک) و تویین ۸۰/۰ درصد کیتوزان) به محلول اضافه شده و در نهایت محلول نهایی به مدت یک دقیقه با هموژنایزر با دور ۲۱۶۰۰ rpm هموژن گردید.

۲-۲-تهیه گوشت فیله مرغ

پس از تهیه لاشه ذبح شده مرغ از کشتارگاه، فیله از قسمت سینه لاشه ذبح شده مرغ جدا شده و به قطعات ۲۵ گرمی تقسیم شد.

۲-۳-تهیه تیمارها و بسته بندی

گروه‌های تیمار شامل گروه شاهد، گروه پوشش کیتوزان، و کیتوزان به همراه اسانس زیره سبز با دو غلاظت ۰،۵ و ۱ درصد تهیه شد. پس تهیه پوشش فیله‌ها از داخل محلول خارج شده و بعد از آب چکانی، در کیسه‌های استریل، بسته‌بندی و در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری گردید. تیمارهای تولیدی در کیسه‌های استریل مخصوص بسته‌بندی و طی ۱۲ روز در دمای یخچالی نگهداری شدند و در روزهای صفر، ۶، ۳، ۹ و ۱۲ ارزیابی میکروبی با سه تکرار انجام گرفت.

۴-۴-شمارش باکتری‌های مزووفیل هوایی

به منظور شمارش تعداد باکتری‌های مزووفیل هوایی به روش استاندارد ملی شماره ۵۲۷۲ انجام شد [۵].

Table1 Counting the total number of Aerobic bacteria in packaged fillet with concentrations of lysozyme and chitosan of coating with essential oil cumin during storage at refrigerating temperatures for 12 days. (in terms of Log cfu/g).(Mean \pm SD)

Day 12	Day 9	Day 6	Day 3	Day 0	Chicken Fillet
7.16 \pm 0.18 ^s	6.79 \pm 0.2 ^r	4.66 \pm 0.21 ^p	4.13 \pm 0.11 ^{no}	2.35 \pm 0.12 ^a	Control sample
6.84 \pm 0.16 ^r	6.56 \pm 0.26 ^r	4.44 \pm 0.24 ^{op}	3.85 \pm 0.23 ^{mn}	2.35 \pm 0.12 ^a	Coated with chitosan
4.39 \pm 0.23 ^{op}	3.16 \pm 0.16 ^{hijk}	2.95 \pm 0.14 ^{efgh}	2.75 \pm 0.13 ^{bcd}	2.35 \pm 0.12 ^a	With coating chitosan containing 1% oil
4.16 \pm 0.15 ^{no}	2.99 \pm 0.13 ^{efgh}	2.73 \pm 0.19 ^{bcd}	2.58 \pm 0.22 ^{abcd}	2.35 \pm 0.12 ^a	With coating chitosan containing 5% lysozyme and 0.5% essential oil
3.99 \pm 0.1 ⁿ	2.91 \pm 0.18 ^{defgh}	2.64 \pm 0.22 ^{abcde}	2.49 \pm 0.15 ^{abc}	2.35 \pm 0.12 ^a	Coating 10%Lysozyme and chitosan containing 0.5%essential oil
3.82 \pm 0.22 ^{mn}	2.74 \pm 0.14 ^{bcd}	2.52 \pm 0.14 ^{abc}	2.67 \pm 0.46 ^{abcde}	2.35 \pm 0.12 ^a	Coating with 5% Lysozyme and chitosan containing 1%oil
3.35 \pm 0.44 ^{ijkl}	2.69 \pm 0.18 ^{abcdef}	2.44 \pm 0.15 ^{ab}	2.36 \pm 0.06 ^a	2.35 \pm 0.12 ^a	Coating 10%Lysozyme and chitosan containing 1%essential oil

* Common lowercase letters in the table indicate no significant difference ($P \geq 0.05$).

مرغ بسته‌بندی شده با پوشش کیتوزان حاوی غلظت‌های متفاوت لیزوژیم و اسانس زیره سبز نگهداری شده در دمای یخچالی در طی ۱۲ روز، در جدول ۲ نشان داده شده است. این نتایج در تمامی روزهای آزمون، در تمامی تیمارها، افزایش تعداد باکتری‌های سرمادوست به صورت معنی‌داری ($P < 0.05$) نشان داده است. نتایج شمارش تعداد باکتری‌های سرمادوست در تیمارهای فیله مرغ شاهد و بسته‌بندی شده با پوشش کیتوزان به‌نهایی و همچنین بسته‌بندی شده با پوشش غلظت‌های لیزوژیم و کیتوزان یک درصد اسانس زیره سبز نشان داد، استفاده از پوشش کیتوزان به‌نهایی جهت بسته‌بندی فیله مرغ در طی روزهای آزمون باعث کاهش تفاوت معنی‌داری ($P < 0.05$) در تعداد باکتری‌های سرمادوست نسبت به تیمار شاهد گردید.

Table2. Counting the total number of psychrophile in packaged fillet with concentrations of lysozyme and chitosan of coating with essential oil cumin during storage at refrigerating temperatures for 12 days. (in terms of Log cfu/g). (Mean \pm SD)

Day 12	Day 9	Day 6	Day 3	Day 0	Chicken Fillet
7.06 \pm 0.07 ^t	6.46 \pm 0.14 ^s	4.61 \pm 0.13 ^q	3.57 \pm 0.27 ^o	2.12 \pm 0.15 ^{ab}	Control sample
5.86 \pm 0.12 ^r	5.66 \pm 0.18 ^r	4.05 \pm 0.1 ^p	3.28 \pm 0.18 ^{mn}	2.12 \pm 0.16 ^{ab}	Coated with chitosan
3.3 \pm 0.06 ^{mn}	2.73 \pm 0.2 ^{ghi}	2.5 \pm 0.16 ^{cdefg}	2.32 \pm 0.13 ^{bcd}	2.12 \pm 0.20 ^{ab}	With coating chitosan containing 1% oil
3.47 \pm 0.15 ^{no}	2.73 \pm 0.14 ^{ghi}	2.63 \pm 0.11 ^{efgh}	2.47 \pm 0.13 ^{cdefg}	2.12 \pm 0.21 ^{ab}	With coating chitosan containing 5% lysozyme and 0.5% essential oil
3.29 \pm 0.17 ^{mn}	2.71 \pm 0.13 ^{fghi}	2.45 \pm 0.1 ^{cdefg}	2.29 \pm 0.09 ^{abc}	2.12 \pm 0.22 ^{ab}	Coating 10% Lysozyme and chitosan containing 0.5%essential oil
3.01 \pm 0.1 ^{ijkl}	2.59 \pm 0.1 ^{defgh}	2.42 \pm 0.12 ^{cdef}	2.24 \pm 0.12 ^{abc}	2.12 \pm 0.23 ^{ab}	Coating 5%Lysozyme and chitosan containing 1% oil
2.93 \pm 0.14 ^{ijk}	2.47 \pm 0.12 ^{cdefg}	2.32 \pm 0.08 ^{bcd}	2.02 \pm 0.13 ^a	2.12 \pm 0.24 ^{ab}	Coating 10%Lysozyme and chitosan containing 1% essential oil

*Common lowercase letters in the table indicate no significant difference ($P \geq 0.05$).

غلظت های لیزوزیم و یک درصد اسانس زیره سبز و به ترتیب، کاهش یافته است، مشاهده گردید استفاده از پوشش کیتوzan به تهایی، باعث ایجاد تفاوت معنی داری ($P \geq 0.05$) در شمارش کلی باکتری سودوموناس نسبت به تیمار شاهد نگردید. ولی استفاده از پوشش لیزوزیم کیتوzan یک درصد اسانس زیره سبز، تفاوت معنی داری ($P \leq 0.05$) در تعداد باکتری سودوموناس در تیمارهای فیله مرغ مشاهده شد.

نتایج شمارش تعداد باکتری های سودوموناس در تیمار های فیله مرغ بسته بندی شده با پوشش کیتوzan حاوی غلظت های متفاوت لیزوزیم و اسانس زیره سبز ۱ درصد نگهداری شده در دمای یخچالی در طی ۱۲ روز، در جدول ۳ نشانت های لیز داده شده. نتایج در تمامی روزهای آزمون، در تمامی تیمارها، تعداد باکتری سودوموناس به صورت معنی داری ($P < 0.05$) در تیمارهای فیله مرغ شاهد و بسته بندی شده با پوشش کیتوzan به تهایی و همچنین

Table 3. Counting the total number of pseudomonas in packaged fillet with concentrations of lysozyme and chitosan of coating with essential oil cumin during storage at refrigerating temperatures for 12 days. (in terms of Log cfu/g). (Mean \pm SD)

Day 12	Day 9	Day 6	Day 3	Day 0	Chicken Fillet
7.81 \pm 0.2 ^q	6.8 \pm 0.15 ^p	4.67 \pm 0.17 ^m	3.63 \pm 0.38 ^k	1.49 \pm 0.15 ^a	Chicken Fillet
7.58 \pm 0.11 ^q	6.72 \pm 0.18 ^p	4.18 \pm 0.17 ^l	3.3 \pm 0.14 ^j	1.49 \pm 0.15 ^a	Control sample
4.03 \pm 0.11 ^l	2.74 \pm 0.05 ^{hi}	2.51 \pm 0.12 ^{efgh}	2.28 \pm 0.15 ^{cde}	1.49 \pm 0.15 ^a	Coated with chitosan
5.44 \pm 0.16 ⁿ	2.64 \pm 0.22 ^{ghi}	2.33 \pm 0.11 ^{cdefg}	2.12 \pm 0.12 ^{bcd}	1.49 \pm 0.15 ^a	With coating chitosan containing 1% oil
4.88 \pm 0.35 ^m	2.45 \pm 0.1 ^{efgh}	2.32 \pm 0.12 ^{cdefg}	2 \pm 0.15 ^{bc}	1.49 \pm 0.15 ^a	With coating chitosan containing 5% lysozyme and 0.5% essential oil
4.07 \pm 0.08 ^l	2.3 \pm 0.06 ^{cdef}	1.94 \pm 0.23 ^b	1.81 \pm 0.17 ^{ab}	1.49 \pm 0.15 ^a	Coating 10% Lysozyme and chitosan contain 0.5% essential oil
3.66 \pm 0.1 ^k	2.07 \pm 0.25 ^{bc}	1.82 \pm 0.18 ^{ab}	1.61 \pm 0.16 ^a	1.49 \pm 0.15 ^a	Coating 5% Lysozyme and chitosan containing 1% oil

* Common lowercase letters in the table indicate no significant difference ($P \geq 0.05$).

کلیفرم به صورت معنی داری ($P < 0.05$), افزایش یافته و در بسته بندی شده با پوشش کیتوzan به تهایی و همچنین بسته بندی شده با پوشش لیزوزیم و اسانس زیره سبز و به ترتیب، کاهش معنی داری مشاهده شد.

نتایج شمارش تعداد باکتری های کلیفرم در تیمارهای فیله مرغ بسته بندی شده با پوشش کیتوzan حاوی غلظت های متفاوت لیزوزیم و اسانس زیره سبز یک درصد نگهداری شده در دمای یخچالی در طی ۱۲ روز در جدول ۴ نشان داده شده است. نتایج در تمامی روزهای آزمون، در تمامی تیمارها، تعداد باکتری های

Table 4 Counting the total number of Coliform bacteria in packaged fillet with concentrations of lysozyme and chitosan of coating with essential oil cumin during storage at refrigerating temperatures for 12 days. (in terms of Log cfu/g). (Mean \pm SD)

Day 12	Day 9	Day 6	Day 3	Day 0	Chicken Fillet
3.56 \pm 0.16 ^s	3.17 \pm 0.15 ^r	2.63 \pm 0.17 ^{mnop}	2.17 \pm 0.08 ^{ijk}	1.52 \pm 0.17 ^{abc}	Control sample
3.42 \pm 0.18 ^s	2.89 \pm 0.22 ^{pq}	2.43 \pm 0.12 ^{klm}	2.09 \pm 0.1 ^{hij}	1.52 \pm 0.17 ^{abc}	Coated with chitosan
2.64 \pm 0.12 ^{mnop}	1.66 \pm 0.2 ^{bcd}	1.36 \pm 0.05 ^{ab}	1.63 \pm 0.2 ^{bcd}	1.52 \pm 0.17 ^{abc}	With coating chitosan containing 1% oil
2.81 \pm 0.15 ^{opq}	1.94 \pm 0.18 ^{fghi}	1.65 \pm 0.18 ^{bcd}	1.59 \pm 0.15 ^{bcd}	1.52 \pm 0.17 ^{abc}	With coating chitosan containing 5% lysozyme and 0.5% essential oil
2.59 \pm 0.22 ^{mno}	1.63 \pm 0.08 ^{bcd}	1.48 \pm 0.06 ^{abc}	1.56 \pm 0.12 ^{abde}	1.52 \pm 0.17 ^{abc}	Coating 10% Lysozyme and chitosan containing 0.5% essential oil
2.41 \pm 0.07 ^{klm}	1.65 \pm 0.19 ^{bcd}	1.66 \pm 0.16 ^{bcd}	1.57 \pm 0.09 ^{abde}	1.52 \pm 0.17 ^{abc}	Coating 5% Lysozyme and chitosan containing 1% oil
1.83 \pm 0.05 ^{efgh}	1.36 \pm 0.05 ^{ab}	1.67 \pm 0.15 ^{bcd}	1.53 \pm 0.07 ^{abed}	1.52 \pm 0.17 ^{abc}	Coating 10% Lysozyme and chitosan containing 1% essential oil

* Common lowercase letters in the table indicate no significant difference ($P \geq 0.05$).

همچنین نتایج این مطالعه نشان دهنده تاثیرات هم افزایی^۲، استفاده توام انسس زیره سبز و لیزوژیم، در غلظت های مختلف، در ساختار پوشش کیتوزان به منظور کاهش شمارش فاکتور های میکروبی مورد مطالعه (شمارش کلی باکتری های هوایی، شمارش باکتری های سرمادوست، شمارش باکتری سودوموناس و شمارش کلیفرم ها) در تیمارهای فیله مرغ بود و باعث کاهش معنی دار ($P<0.05$) شمارش فاکتور های مذکور گردید.

این نتایج با نتایج به دست آمده در تحقیقات امیری و همکاران (۱۳۸۷)، Park و همکاران (۲۰۰۴)^[۹] و Nanasombat و همکاران (۲۰۰۵) مطابقت داشت.^[۱۰]

بیشتر تحقیقات مشابه نشان داده بودند که لیزوژیم ۱۰ درصد سبب کاهش تعداد باکتری ها می شد . در حالی که تحقیقات ما با استفاده از اثرات هم افزایی انسس زیره سبز در یک درصد تغییرات معنی داری را نشان داد و نتایج نشان می دهد که مدت زمان ماندگاری محصول فیله مرغ می تواند تأثیش از سه روز افزایش داد.

۶- منابع

- [1] Amiri.S.lari.M and Ramezani.R (1387) Antimicrobial activity of lysozyme glycosylated with dextran against gram-negative bacterium Escherichia coli. Eighteenth National Congress of Food Science and Technology.
- [2] Özge Erdohan, Z., Çam, B., Turhan, K. N. (2013). Characterization of antimicrobial polylactic acid based films. Journal of Food Engineering, 119 (2), 308-315.
- [3] Ahmadi, L. (1999). Study on chemical composition of the essential oil from seeds of Cuminum Cyminum L. Iraninan J Med Aromatic plants Res; 6: 97-113.
- [4] Ojagh, S. Rezaei, M. Razavi, H. and Hosseini, M. (2010). Effect of chitosan coatings enriched with cinnamon oil on the quality of refrigerated rainbow trout. Food chemistry.
- [5] National standard of 5272-1.Microbiology of the food chain —Horizontal method for the enumeration of microorganisms — Part 2. synergistic

۱-۴- اثرات تداخلی متغیرهای مورد آزمایش بر روی شمارش باکتری های مورد مطالعه

پس از بررسی اثر تداخلی فاکتورهای مورد آزمایش بر متغیر وابسته (لگاریتم تعداد باکتری) بر حسب Log cfu/g به وسیله روش آنالیز واریانس دوطرفه (Two way) مشخص شد، در مورد اثرات تداخلی دوگانه متغیرهای مورد آزمایش بر متغیر وابسته، شمارش کلی باکتری های هوایی، شمارش باکتری های سرمادوست، شمارش باکتری های سودوموناس و شمارش کلیفرم ها در حالت زیر، تأثیر معنی دار مشاهده گردید ($P<0.05$).

از فرمول (میزان غلظت های لیزوژیم مورداستفاده در پوشش کیتوزان×میزان غلظت های انسس زیره سبز مورداستفاده در پوشش کیتوزان) استفاده شد.

۵- بحث

نگهداری مواد غذایی با استفاده از مواد طبیعی و با کمک روش های نوین بسته بندی، به یکی از مهم ترین اهداف صنعت غذا تبدیل شده است.

در این تحقیق، تلاش شد تأثیرات غلظت های مختلف لیزوژیم به کارفته در ساختار پوشش کیتوزان به همراه کیتوزان، بررسی شود.

این تحقیق نشان داد روند رشد میکروبی در تمامی فاکتورهای مورد ارزیابی (تعداد کلی باکتری های هوایی، تعداد باکتری های سرمادوست، تعداد باکتری سودوموناس و تعداد کلیفرم ها)، در تمامی روزهای آزمون (صفر، ۶، ۳، ۹ و ۱۲) در تمامی تیمارهای موردمطالعه، به صورت معنی داری ($P<0.05$) افزایش یافت. در این تحقیق مشاهده گردید استفاده از تیمار پوشش داده شده با کیتوزان حاوی انسس زیره سبز و لیزوژیم به صورت توام در بهترین حالت آزمون (۱۰ درصد لیزوژیم و ۱ درصد انسس زیره Log cfu/g، ۳,۸۱ Log cfu/g، ۴,۱۳ Log cfu/g و ۱,۷۳ Log cfu/g) باعث کاهش کلی شمارش کلی باکتری های هوایی، شمارش باکتری های سرمادوست، شمارش باکتری سودوموناس و شمارش کلیفرم ها، به ترتیب، نسبت به تیمار شاهد، در روز نهایی آزمون (روز ۱۲ آزمون)، گردیده است.

- [9] Park, S., Daeschel , M . and Zhao , Y.(2004). Functional properties of antimicrobial lysozyme-chitosan composite films. Journal of food science 69.8.
- [10] Nanasombat, S. and Lohasupthawee, P. (2005). Antimicrobial activity of crude ethanolic extracts and essential oils of spices against *Salmonella* and other Enterobacteria. Journal of science technology. 5 . 527 – 538.
- 1:Colony count at 30 °C by the pour plate technique
- [6] Karim.g. microbiological tests of food .Tehran university publishments
- [7]National standard 4791. meat and meat products-enumeration of pseudomonas spp.
- [8] National standard 11166-microbiology of food and animal feeding stuffs-horizontal method for the detection and enumeration of coliforms- most probable number technique.

Synergistic effect of lysozyme on chitosan-based films including Cumin essential oil on the antimicrobial activity

Heydary, M. ¹, Mahasty Shotorbany, P. ^{2*}, Akhoundzadeh Basti, P. ³

1. Islamic Azad University Science and Research Branch, Department of Food Science and Technology
2. Department of food quality control and hygiene, science and research branch, Islamic Azad ,University,Tehran
3. Department of Food Safty and Hygiene , Science and ResearchBranch,Islamic Azad University,Tehran,Iran

(Received: 2016/09/03 Accepted: 2016/11/05)

Lysozyme- chitosan-cumin oil films were develop for enhancing the antimicrobial properties of chitosan films. A different concentration lysozyme solution was incorporated in to chitosan 2% film forming solution and 1% oil cumin .The film used for microbial properties of chicken fillets stored at refrigerator. Lysozme and cumin oil releases from the matrix of chitosan film and effect on antibacterial properties such as total mesophilic bacteria, microbial Total bacterial count, Psychrophiles, Coliforms and Pseudomonas . Results showed that 10% lysozyme and 1% cumin oil enhance the efficiency of chitosan film against bacteria in chicken fillet. Statistical results showed that 3 log cfu/g reduced in mesophilic bacteria in 12 days and 3 log cfu/g , 1.1 log cfu/g , 3 log cfu/g in Psychrophiles, Coliforms and Pseudomonas bacteria respectively .So the results showed the synergistic effect of oil cumin and lysozyme in to chitosan –based films . Thus brooding their application enhancing food quality and saftely .

Key words: *Cuminum cyminum*, Essential oil, Lysozyme, Synergistic, Antimicrobial properties.

* Corresponding Author E-Mail Address: pmahasti@yahoo.com